

Postępowanie w chromaniu przestankowym

dr n. med. Tomasz Grzela, dr n. med. Arkadiusz Migdalski

z Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień

Streszczenie:

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest częsta manifestacja układowej choroby jaką jest miażdżyca. Leczenie chorych z chromaniem przestankowym musi być planowane uwzględniając naturalny przebieg choroby. Poza treningiem marszowym obowiązkowo u wszystkich chorych konieczne są modyfikacja czynników ryzyka i stylu życia. Tylko nieliczni chorzy wymagają rewaskularyzacji lub leczenia farmakologicznego w celu poprawy ograniczeń marszowych

Słowa kluczowe: chromanie; miażdżyca; czynniki ryzyka.

Summary:

Peripheral arterial disease is the common manifestation of the systemic disease atherosclerosis. The management of the patients with claudication has to be planned in the context of its natural history. Next to the exercise training, risk factors control and lifestyle modification are mandatory in all patients. Revascularisation or pharmacotherapy to treat walking limitation are indicated in selected patients.

Key words: claudication; atherosclerosis; risk factors.