

Wtórna nadczynność przytarczyc

Secondary hyperparathyroidism

lek. med. Aneta Piotrowska

z Kliniki Endokrynologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Streszczenie

W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat etiopatogenezy, rozpoznania, objawów oraz leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc. Omówiono główne mechanizmy zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej leżące u podstaw rozwoju tej jednostki chorobowej, w zależności od wywołujących ją przyczyn. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiej i odpowiedniej korekcji zaistniałych zaburzeń, z uwzględnieniem leczenia choroby podstawowej, gdyż jest to proces potencjalnie odwracalny. W przeciwnym razie dochodzi do trwałych uszkodzeń układu kostnego i innych narządów.

Słowa kluczowe: wtórna nadczynność przytarczyc, parathormon, gospodarka wapniowo-fosforanowa, etiologia, diagnostyka, leczenie.

Summary

In the paper, the author discusses current opinions on etiopathogenesis, diagnosis, clinical symptoms and therapy of secondary hyperparathyroidism. The author presents main mechanisms of calcium-phosphorus homeostasis disorders, from which this disease results depending on its cause. The need of soon and the proper correction of the primary disorders was underlined as the process is potentially reversible. Otherwise it leads to permanent, irreversible damages of skeletal system and another organs.

Key words: secondary hyperparathyroidism, parathormon, calcium-phosphorus homeostasis, etiology, diagnostic criteria, therapy.