

Postępowanie w asymptomaticznej pierwotnej nadczynności przytarczyc

dr n. med. Arkadiusz Zygmunt

z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

z Kliniki Endokrynologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Streszczenie

Wraz z coraz szerszym wykonywaniem badań laboratoryjnych, zwiększa się częstość rozpoznawania pierwotnej nadczynności przytarczyc (PHPT). Wśród nowo rozpoznanych przypadków choroby, dominują postaci skąpoobjawowe bądź bezobjawowe. Dotychczas, leczeniem z wyboru pacjentów z asymptomaticzną PHPT było leczenie zachowawcze. Uważa się jednak, że u pacjentów tych, występować mogą subtelnie wyrażone objawy kliniczne z narządów i układów, ze strony których występują objawy w pełnoobjawowej postaci choroby. Dlatego w ostatnich latach coraz bardziej rozważane jest chirurgiczne leczenie chorych z asymptomaticzną PHPT. W pracy przedstawione aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów z asymptomaticzną PHPT.

Summary

With increasing application of laboratory tests the frequency of establishing the diagnosis of primary hyperparathyroidisms (PHPT) has risen. Oligo-symptomatic or asymptomatic types predominate among the newly diagnosed cases of the disease. Until recently, conservative treatment was the treatment of choice in patients with asymptomatic PHPT. However, it has been found that those patients may present with subtle clinical symptoms from organs and systems which are involved in the fully symptomatic disease. Therefore, nowadays surgical treatment is being more and more frequently considered as an option for patients with asymptomatic PHPT. The paper present current guidelines considering diagnosis and treatment of patients with asymptomatic PHPT.