

# Postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w nadciśnieniu tętnicznym u noworodka

## Hypertension in neonate – diagnosis and treatment

**lek. med. Julita Latka-Grot, dr n. med. Justyna Czech-Kowalska,  
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska**

z Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

---

### Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze jest zbyt rzadko rozpoznawane w okresie noworodkowym, mimo że pomiar ciśnienia tętniczego należy do rutynowych procedur w oddziałach intensywnej opieki. Wynika to w dużej mierze z braku jednoznacznych kryteriów rozpoznawania, jak i z niedoskonałości metod pomiarowych. Najczęściej mamy do czynienia z nadciśnieniem wtórnym do patologii nerek, układu naczyniowego czy zaburzeń endokrynologicznych – znalezienie przyczyny wymaga szerokiej diagnostyki różnicowej. W wielu przypadkach po wdrożeniu leczenia choroby podstawowej, dochodzi do normalizacji wartości ciśnienia tętniczego bez konieczności dalszego postępowania farmakologicznego. W leczeniu dysponujemy szeroką gamą leków – jednak brak jest jednolitych standardów.

**Słowa kluczowe:** noworodek, wcześniak, nadciśnienie tętnicze, ciśnienie tętnicze

### Summary

Although blood pressure measurement is a routine procedure in NICU – neonatal hypertension is underdiagnosed. Diagnosis criteria have not been completely standardised. Hypertension is usually secondary to other diseases such as renal or renovascular anomalies, aortic coarctation or endocrine disorders. A wide range of therapeutic agents are available but treatment standards are not unified.

**Key words:** newborn, preterm, hypertension, blood pressure