

Profilaktyka ospy wietrznej u dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 2012

The prophylaxis of varicella in children according to PSO 2012

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Streszczenie

Ospa wietrzna jest wysoce zakaźną chorobą, wywołaną przez wirus Varicella-zoster. Powoduje zachorowania nawet u 90% osób, mających kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną. Najczęściej rozpoznawana jest u dzieci, w 80% przypadków do 9. roku życia. Szczególnie groźny jest przebieg ospy wietrznej u dzieci z zaburzeniami odporności. Niezwykle istotna jest ochrona poprzez szczepienie osób z otoczenia, szczególnie mających bliski kontakt z chorym dzieckiem. W Polskim Programie Szczepień Ochronnych obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw ospie wietrznej obejmuje dzieci do ukończenia 12. roku życia z grupy ryzyka oraz dzieci zdrowe z ich otoczenia, a także dzieci narażone na zakażenie ze względów środowiskowych.

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, szczepienia

Summary

Varicella is a highly infectious disease caused by the varicella-zoster virus (VZV). Up to 90% of people, who have had a contact with varicella virus, will develop varicella infection. Varicella is most common in children, 80% of cases occur among children below the age of 9. Varicella may run an especially severe course in immunocompromised children. Therefore it is extremely important to vaccinate the patients' contact, children within the same household. The Polish Immunization Schedule required to undergo mandatory vaccination against varicella protective covers children up to the completion of 12 years of age at risk group and healthy children with their environment, as well as children at risk of infection for environmental reasons.

Key words: varicella, vaccination