

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu koneckiego w dniu 14 marca 2023 roku pierwszego ogniska/przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Cieklińsko, gmina Ruda Maleniecka, u ptaków dzikich – łabędzi niemych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich w dniu 14 marca 2023 r. wydał rozporządzenie nr 1/2023 w sprawie wyznaczenia **strefy zakażenia** w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu koneckiego. **Strefą zakażenia** objęto miejscowości: Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Młotkowice, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka, Machory, Kołoniec, Tama w gminie Ruda Maleniecka oraz miejscowość Jacentów w gminie Radoszyce, w powiecie koneckim.

Na obszarze wyznaczonym jako strefa zakażenia HPAI nakazuje się:

- 1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;
- 2) karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
- 3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
- 4) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanym w obrębie gospodarstwa;
- 5) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanym w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
- 6) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
- 7) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
- 8) powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o każdym przypadku znacznej liczby nagłych padnięć u drobiu i dzikich ptaków.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

- 1) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków;
- 2) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości. Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze (o czym wspomniano wyżej). Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768).

Na podejrzenie wystąpienia grypy ptaków mogą wskazywać następujące objawy kliniczne:

- 1) wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie apetytu i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność,
- 2) chore ptaki często siedzą lub stoją w półotępiącym stanie, dotykając głowami podłóża,
- 3) obrzęk i sinica grzebieni i dzwonek, a na ich końcach mogą pojawiać się wylewy krwawe lub wybroczyny,
- 4) trudności z oddychaniem,
- 5) obfite łzawienie,
- 6) wodnista biegunka i nadmierne pragnienie,
- 7) na nieopierzonych miejscach skóry można obserwować wylewy krwawe,
- 8) upadkowość w stadzie może osiągnąć 100 %.
- 9) choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego apetytu, stroszenia piór i gorączki,
- 10) kury nioski mogą początkowo składać jaja o miękkich skorupkach lub pozbawione skorup (tzw. lanie jaj), następuje spadek nieśności,
- 11) u brojlerów i indyków w objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu, pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości, mogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręczy szyi i ataksja,
- 12) u gęsi i kaczek okres bezobjawowy może być nawet kilkunastodniowy, częściej niż u innych gatunków mogą występować objawy neurologiczne i niższa śmiertelność.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie, tel. 41-372-31-85, e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.pl lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Końskich

lek. wet. Agata Hucal