

	<b>ZAŁĄCZNIK</b>		Zał-04/PO-06/PQ-09
	<b>DEKONTAMINACJA ROZLANYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH I WYDALIN</b>		Data zatwierdzenia: 17.11.2019R.
			Wersja II
			Strona 1 z 3

1. Założyć rękawice i jednorazowy fartuch.
2. Użyć zestawu do dekontaminacji rozlanych płynów ustrojowych i wydaliny. W zestawie znajdują się: Okulary, lignina/ręczniki jednorazowe ZZ, rękawice, ściereczki.
3. Rozlane płyny pokryć równomiernie płynnym środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania (bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym- HIV, HBV i HCV).
4. Pozostawić na czas nie krótszy niż 5 min.
5. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym materiałem z zestawu j/w (płat ligniny lub ręcznik jednorazowego użytku) następnie umieścić w pojemniku na materiał zakaźny.
6. Oczyszczoną powierzchnię ponownie zdezynfekować jak w pkt. 2 i 3.
7. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice i jednorazowy fartuch, a następnie umieścić je w pojemniku na odpady medyczne.
8. Natychmiast umyć i zdezynfekować ręce.

	Nazwisko i imię	Data	Podpis/pieczętka
Sporządził:	<i>Halina Garbowska</i>	<i>26.11.2019r.</i>	