

ZASADY DEZYNFEKCJI BŁON ŚLUZOWYCH

1. Zasady:

- Należy stosować preparaty antyseptyczne w oryginalnych opakowaniach.
- Preparaty antyseptyczne (wodne roztwory) powinny posiadać szeroki zakres działania.
- Powinny być zarejestrowane z przeznaczeniem do stosowania do dezynfekcji błon śluzowych (niektóre preparaty nadają się również do dezynfekcji ran).
- Nie wolno stosować antyseptyków zawierających alkohole
- Nie powinno się dezynfekować ran preparatami, które były stosowane zanim wprowadzono normy i dokładnie określono wymagania wobec preparatów antyseptycznych, np. rivanol, hibitan/chlorcheksydyna w roztworze wodnym czy woda utleniona.

2. Sposoby dezynfekcji błon śluzowych:

2.1. Dezynfekcję błon śluzowych należy przeprowadzać poprzez:

- płukanie (np. jamy ustnej)
- przykładanie jałowymi kompresami nasączonymi preparatem anty-septycznym (okolica krocza i odbytu)
- sześciokrotne zmywanie (przecieranie) okolicy, w której będzie:
 - wykonane cięcie chirurgiczne lub wprowadzony endoskop operacyjny (pochwa),
 - zakładany cewnik do pęcherza moczowego (tamponami (kulami) z gazy nasączonymi preparatem antyseptycznym do dezynfekcji błon śluzowych (sześciokrotne użycie tamponu jest podyktowane wymuszeniem czasu dezynfekowania, który powinien być przestrzegany 3-5 minut)
- spryskiwanie preparatem antyseptycznym (spryskiwanie błon śluzowych należy stosować w bardzo uzasadnionych sytuacjach – **nie powinno się spryskiwać błon śluzowych zakażonych.**

2.2. Po zastosowaniu preparatu antyseptycznego na błony śluzowe należy odczekać czas określony przez producenta środka, aby preparat miał czas na zadziałanie bójcze na drobnoustroje.

3. Zalecenia:

3.1. Nie wolno stosować na błony śluzowe preparatów zawierających alkohole!

3.2. Po zastosowaniu preparatu na błony śluzowe, należy odczekać określony czas na zadziałanie bójcze, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.3. Stosować preparaty w oparciu o aktualny Wykaz środków dezynfekcyjnych stosowanych Szpitalu

3.4. Stosować preparaty antyseptyczne w oryginalnych opakowaniach.

3.5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego :

- Nie wolno dotykać opakowania preparatu bez wcześniejszej dezynfekcji rąk
- Okresowo, np. na zakończenie dyżuru lub częściej, należy dezynfekować powierzchnię opakowania preparatem alkoholowym o szerokim zakresie działania przez przetarcie powierzchni czystą ściereczką/ręcznikiem jednorazowym nasączonym preparatem dezynfekcyjnym.